

**Dr. Christophe Karman**

**Dr. Uta Schomer**

**Dr. Klaus Hopfener**

**Gregor Kuwert**


Zahnärzte

Kleiststr. 3

79312 Emmendingen

Telefon: 07641/8835 · Fax: 07641/48610 · [www.zahnaerztliches-kompetenzzentrum.com](http://www.zahnaerztliches-kompetenzzentrum.com)

Dres. Karman, Schomer, Hopfener, Kuwert · Zahnärzte · Kleiststr. 3 · 79312 Emmendingen



### **Verhalten nach operativem Eingriff**

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

eine Kieferoperation führt zu starken Schluckbeschwerden und zu einer Behinderung der Mundöffnung.

Es ist ratsam, im Interesse eines ungestörten Heilungsablaufs folgende Maßnahmen einzuhalten:

#### **Tupfer:**

Eine halbe Stunde nach der Operation auf den eingelegten Tupfer aufbeißen, danach den Tupfer entfernen.

#### **Kühlen:**

Die ersten zwei Tage den Operationsbereich von außen kühlen. (z.B.) Eisbeutel: Eiswürfel in einen Plastikbeutel einfüllen und in ein dünnes Tuch einwickeln, auf die Wange legen.

**Keine Wärme!! Jede Form von Durchzug (offenes Fenster), vermeiden!!**

#### **Ernährung:**

Nahrungsaufnahme erst ab Wiederkehren des Gefühls. Meiden Sie am 1. und 2. Tag, Kaffee, schwarzen Tee, Fruchtsäfte, ungekochte Speisen.

**Nicht Rauchen, kein Alkohol.**

**bei Schmerzen kein Aspirin einnehmen.**

#### **Mundpflege:**

Am Operationstag Mund nicht spülen (Blutungsgefahr). Vom nächsten Tag an vorsichtige Mundspülungen, z. B. mit kaltem Kamillentee oder Chlorhexidinlösung, vorsichtiges Zähneputzen, wobei das Operationsgebiet an diesem Tag noch ausgespart wird.

#### **Verbot!!**

Das spielen von Blasinstrumenten ist absolut verboten!

#### **Nachblutung:**

Nach Eingriff kann noch einige Stunden Blut aus der Wunde sickern. Dies verdünnt sich mit dem Speichel und kann eine starke Nachblutung vortäuschen. Bei stärkerer Blutung aus der Wunde ist ein Druckverband erforderlich: Ein frisch zusammengerolltes **Stofftaschentuch** auf die Wunde legen und zusammenbeißen.

#### **Antibiotika:**

Werden Ihnen Antibiotika verordnet, nehmen Sie diese bitte ohne Unterbrechung nach ärztlicher Verordnung ein. Informieren Sie Ihren Arzt über bestehende Allergien.

**Führen Sie unmittelbar nach der Operation kein Fahrzeug.**